

Operation for forhudsfor snævring (phimosi s)

Omskæring foretages i tilfælde af forhudsfor snævring (Phimosi s).

Før operationen

Ingen forberedelser.

Operationen

Operationen foretages i lokalbedøvelse som lægges ved roden af penis. Forhuden fjernes helt eller delvist.

Sammensyning af hudrandende sker med opløselig tråd, der falder af efter cirka 2 uger.

Efter operationen

De første dage vil der uundgåeligt komme ømhed og hævelse, ofte også lidt blødning, der kan give anledning til misfarvning, men det forsvinder af sig selv.

Under ophelingen værker det ofte lidt fra sårrandene, men regulær infektion er yderst sjældent.

Hold dig i ro det første døgn.

Skyl såret under rindende vand efter toiletbesøg.

Læg penis op ad maven i et par stramsiddende underbukser de første dage

Det anbefales at du har anskaffet noget smertestillende håndkøbsmedicin f.eks. Paracetamol eller Ipre n inden operationen, så det kan benyttes efter operationen.

Hvis der ved operationen er bevaret forhud er det vigtigt at du fra to dage efter operationen begynder at bevæge forhuden frem og tilbage over penishovedet, såkaldt "forhudsgymnastik". Det kan passende gøres i forbindelse med brusebad. Dette er med til at sikre at forhuden forbliver elastisk og ikke snævrer til igen.

Du må tage brusebad på 2. dagen efter operationen.

Restriktioner:

Sygemelding: Ca. 3-6 dage.

Søg læge: Ved større blødning eller tegn på betændelse skal kirurgen, vagtlæge eller skadestue kontaktes.

Refleksmæssig rejsning kan ikke undgås, og det kan ske, at der i den forbindelse kommer blødning under huden. I så fald kan det hjælpe at lægge en plasticpose med isterninger på såret for at mindske hævelsen.

Det sker også jævnligt at et par af de tråde der er syet med går i stykker. Det er helt forventeligt, og ikke noget der skal gøres noget ved.

Det er vigtigt at have tålmodighed med det kosmetiske resultat. Der går ofte flere måneder før man kan se, hvordan slutresultatet er.