

Patientvejledning Gastroskopi

Gastroskopi er en kikkertundersøgelse af den øvre mave-tarmkanal (tolvfangertarm, mavesæk og spiserør)

Før undersøgelsen

VIGTIGT: Du må ikke spise 6 timer før og ikke drikke 2 timer før undersøgelsen. Mindre mængder vand kan indtages indtil 2 timer før undersøgelsen. Tager du fast medicin, må du tage denne indtil 2 timer før undersøgelsen.

Undersøgelsen

Undersøgelsen foretages med et moderne, bøjeligt video-gastroskop, så man via en TV-skærm er i stand til at inspicere tolvfangertarm, mavesæk og spiserør. Selve undersøgelsen varer få minutter og du bliver bedøvet i svælget med en spray, så man undgår de værste opkastningsfølelser. Gastroskopet nedføres samtidig med, at der foretages en synkebevægelse. Under undersøgelsen pustes luft i mavesækken, hvilket er forbundet med et vist ubehag i form af kvalme og trykken i maven. Undervejs kan tages vævsprøver fra mavesækkens slimhinde med henblik på påvisning af bakterien *Helicobacter Pylori* – du kan ikke mærke at prøverne tages. De fleste patienter finder undersøgelsen let til moderat ubehagelig på grund af opkastningsreflekser.

Efter undersøgelsen

DET ER VIGTIGT, AT DU DEN FØRSTE TIME EFTER UNDERSØGELSEN IKKE DRIKKER ELLER SPISER NOGET, IDET DU RISIKERER AT FÅ TINGENE I DEN GALE HALS PGA. BEDØVELSEN I SVÆLGET

Hvis du undtagelsesvis har fået beroligende medicin, må du ikke arbejde eller køre bil samme dag, og du skal sørge for hjemtransport (pårørende eller Falck). Hvis du ikke har fået beroligende medicin, kan du tage på arbejde

SVAR PÅ UNDERSØGELSEN

Du vil umiddelbart efter undersøgelsen få svar på, hvad undersøgelsen viste. Svar på evt. vævsprøver foreligger efter 7-10 dage

GENER EFTER UNDERSØGELSEN

Ømhed i næsen, halsen og trykkende fornemmelse i maven kan forekomme.

ER UNDERSØGELSEN FARLIG?

Gastroskopi er en ufarlig undersøgelse. I yderst sjældne tilfælde kan der forekomme komplikationer i form af hul på spiserør/mavesæk eller blødning.

Disse komplikationer viser sig ved:

Svære mavesmerter

Blodige eller sorte opkastninger Vejrtrækningsvanskeligheder Høj feber.

Skulle du få et eller flere af disse symptomer skal du henvende dig til klinikken, Regionens akuttelefon 1813 eller skadestue.