

Operation for kort penisbånd (frenulum breve)

Et kort penisbånd på undersiden af penis medfører smerter ved samleje og eventuel sprængning med efterfølgende blødning.

Operation for kort penisbånd

Operationen foregår i lokalbedøvelse.

Under operationen laver man en overklipping af penisbåndet på tværs og sammensyr det på langs.

Operationen foregår i lokal bedøvelse og varer ca 10 minutter.

Før operationen

Er du i behandling med blodfortyndende medicin, skal du aftale med lægen, om du skal holde pause med det inden operationen.

Indkøb evt smertestillende til brug efter operationen.

Efter operationen

Der kan efter operationen være smerter og ømhed i operationsområdet, især ved vandladning. Det er helt normalt og forsvinder efter cirka 2-3 dage.

Efter operationen anbefales smertestillende med eksempelvis paracetamol eller Iprex.

Huden omkring penis kan efter operationen være hævet og misfarvet. Det er helt normalt og forsvinder i løbet af en uge.

Forsvinder hævelsen ikke, kommer der rødme omkring såret, varme og væske eller får du feber, skal du tage kontakt til din læge.

Hold dig i ro det første døgn.

Skyl såret under rindende vand efter toiletbesøg.

Læg penis op ad maven i et par stramtsiddende underbukser de første dage

Sårene er syet med opløselige tråde, som forsvinder af sig selv. Trådene kan dog afklippes efter 8 - 10 dage hvis sårhelingen er fuldstændig.

Sygemelding

Der er sjældent behov for at blive sygemeldt.

Samleje

Undgå samleje de første 2 uger .

Herefter vil kondom og glidecreme skåne det ny-opererede område de næste 3-5 uger .