

Patientvejledning

Operation omkring endetarmsåbningen

Operation i eller omkring endetarmsåbningen foretages, fx hvis man skal fjerne større hæmorider, løs hud efter hæmorider, bylder eller behandle en kronisk revne i endetarmsåbningen, som ikke heler på medicinsk behandling.

Før operationen

Begynd 3 dage før operationen med at tage 1 eller 2 tabletter (du må prøve dig frem) Magnesia 500 mg om aftenen for, at sikre at afføringen bliver blød. **Husk at drikke rigelig væske.** Smør det udleverede overflade bedøvende creme omkring endetarmsåbningen 1 time før operationen. Huden er meget tynd i området, og ved at gøre det, tager det toppen af ømheden, når lokalbedøvelsen anlægges. Denne anlægges via et stik i selve hæmoriderne eller omgivelserne til endetarmsåbningen. Man vil som regel kunne køre hjem selv efter operationen, dog ikke på cykel.

Efter operationen

Mod smerter: Det er en god ide at ligge den første dag, da det letter på smerterne. De første 2-3 dage efter nogle operationer, kan være smertefulde, hvorfor man med fordel vil kunne blødgøre afføringen for at lette passagen igennem operationssåret med Magnesia. Mod smerter kan tages Paracetamol eller Ibuprofen.

Forbinding: Eventuel forbinding fjernes dagen efter operationen. Operationssåret rengøres bedst ved at skylle med håndbruser to gange dagligt efter toiletbesøg, vådservietter kan også bruges, indtil operationsområdet er smertefrit.

Eventuelt kan kolde omslag anvendes, både for at standse blødning og reducere smerter. Brug bind så længe der er blødning. Der skal ikke fjernes sting.

Hævelse: Det er ikke unormalt at området er hævet i et par måneder efterfølgende. Du kan komme til en kontrol ca. 10-12 dage efter operationen.

Sygemelding : Efter nogle operationer kan sygemelding være nødvendig i 3-5 dage.

Komplikationer:

Der kan være blødning i nogle dage, men alvorlig blødning er meget sjældent, og infektion er yderst sjældent.

Søg læge:

Ved større blødning skal 1813 kontaktes.